



Instrucciones para temporales de coronas y puentes

- No comer hasta que se quite la anestesia. Normalmente la anestesia dura dos o tres horas, pero puede ser más tiempo. Si no se quita la anestesia rápido, trata de no comer comida que tienes que masticar.
- Espere tener sensibilidad y un poco de dolor alrededor de la encía para 24 - 48 horas. Tomando ibuprofeno o acetaminofén debe ser suficiente.
- Enjuague con agua tibia y sal para 24-48 horas.
- Cuando estas pasando el hilo dental, mover el hilo hasta la encía, y después halarlo hacia el lado. No halar el hilo hacia arriba.
- Si estas usando un cepillo eléctrico, apágalo mientras que estas cepillando el área.
- Evitar comer comida dura o pegajosa.
- Un poco de sensibilidad al frio y caliente es normal. Un temporal solamente es una solución temporario.
- Es importante a llamar a la oficina si el temporal sale. El temporal aguanta el espacio para la corona permanente. Si no está ahí, puede causar problemas para la corona permanente.
- Si la corona se sale cuando la oficina está cerrada, las cosas que puedes hacer son:
 - Usando una pasta de diente o una crema de dentaduras puede ayudar que el temporario se quede in lugar hasta que puedes venir a la oficina. Si no está muy fijo, sácalo antes de dormir.

Si algo pasa con su temporario, por favor llama a nuestra oficina.

(239) 774-3017